

Zitation: Feige, Klaus-Dieter; Feige, René (2014): Analyse von populationsökologischen Parametern, Wanderbewegungen und Todesursachen von Vogelarten in Mecklenburg-Vorpommern anhand von Beringungs- und Wiederfunddaten der Beringungszentrale Hiddensee – Limikolen. <http://www.o-amv.de/literatur/beringungs-analyse.html>


LIMIKOLEN

SANDERLING (*Calidris alba*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 428
 davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 0
 davon ♂: 0 und ♀: 0

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)



Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 9
 Individuen: 8
 davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 7
 davon in: 3 x Großbritannien, 1 x Frankreich, 1 x Polen, 1 x Sowjetunion, 1 x Spanien

Reproduktion und Mortalität

Altersstruktur

Verteilung der Lebensjahre (per 1. Juli) von tot gefundenen Vögeln, die nestjung bzw. im 1. Jahr in Mecklenburg-Vorpommern beringt wurden (n = 2)

Lebensjahr	Anzahl
1	1
3	1


Höchstalter aus allen Wiederfunden: >4 Jahre, 1 Monat
 zweitältester Vogel: >2 Jahre, 1 Monat
 mittleres Totfund-Lebensjahr: 2,0



Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 430



Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 430




Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Erstfang:	06.05.
durchschnittlicher Jahres-Letzfang:	03.10.
Durchzugsmedian Herbst:	22.09.
größte Wiederfundentfernung:	2278 km



Fernfunde






ALPENSTRANDLÄUFER (*Calidris alpina*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 70.917
davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 291
davon ♂: 1.662 und ♀: 1.648

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)




Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 1843
 Individuen: 1673
 davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 1020
 davon in: 209 x Frankreich, 181 x Großbritannien, 152 x Schweden, 112 x Niederlande, 100 x Polen, 88 x Deutschland, 38 x Finnland, 27 x Dänemark, 27 x Italien, 25 x Spanien, 15 x Sowjetunion, 12 x Belgien, 9 x Ukraine, 7 x Portugal, 5 x Kanalinseln, 5 x Marokko, 1 x Malta, 1 x Norwegen, 1 x Russland, 1 x Tunesien

Wiederfunde außerhalb von M-V beringter und in M-V
 wiedergefundener Vögel: 481
 Individuen: 430
 davon aus: 340 x Polen, 32 x Finnland, 26 x Großbritannien, 19 x Deutschland, 12 x Norwegen, 11 x Italien, 10 x Dänemark, 7 x Ukraine, 4 x Russland, 2 x Frankreich, 2 x Lettland, 2 x Litauen, 2 x Slowakei, 2 x Spanien, 2 x Tschechische Republik, 2 x Ungarn, 1 x Belgien, 1 x Israel, 1 x Niederlande, 1 x Schweden, 1 x Slowenien, 1 x Weißrussland

Reproduktion und Mortalität

Anzahl beringter, nichtflügler Jungvögel je Dekade (n = 291)




Median (Dekade) = 15




Reproduktion

Anzahl beringter Jungvögel je Nest
(n = 68 Nester) 198
Mittelwert: 2,92 Jungvögel
Maximalwert: 4 Jungvögel



Altersstruktur

Verteilung der Lebensjahre (per 1. Juli) von tot gefundenen Vögeln, die nestjung bzw. im 1. Jahr in Mecklenburg-Vorpommern beringt wurden (n = 285)



Höchstalter aus allen Wiederfunden: 21 Jahre, 8 Monate
zweitältester Vogel: >19 Jahre, 2 Monate
mittleres Totfund-Lebensjahr: 2,0

Verlustursachen

Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundenen Vögeln (n = 362)


Anteil der Totfunde "ohne bekannte Verlustursache": 50,8 %

Anthropogene Verlustursachen: 40,3 %



Verteilung der bekannten Verlustursachen:

Ursache	Anzahl
Abschuss	133
verunglückt infolge menschlicher Tätigkeit	1
Beute menschlicher Nachstellung	10
Freileitung	1
sonstige Kollisionen	1
Beute von Haustier	1
Beute von Wildtier	1
Beute von (Greif-)Vögeln	10
Krankheit (Virus, Bakterien)	2
ertrunken	3
Kälte, Schnee, Eis	15






Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 71.121




Fangzahlen je Dekade nach Geschlecht (♂: blau, ♀: rot), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 3.231





Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 71.121




Fernfunde





Ein Wiederfund wurde der Unterart *alpina* zugeordnet:






Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Erstfang: 30.01.
Durchzugsmedian Frühjahr: 19.04.
durchschnittlicher Jahres-Letztfang: 04.11.
Durchzugsmedian Herbst: 28.09.
größte Wiederfundentfernung: 3705 km

Brutorttreue/-wechsel: n = 18 Vögel

Tabelle / Diagramm (Abstände Brutort zum früheren Brutort):

Klasse (km)	Anzahl
0-5	2
6-100	0
101-200	1
201-400	1
>400	14



Geburtsorttreue (Dismigration): n = 3 Vögel

Tabelle / Diagramm (Abstände Brutort zum Geburtsort):

Klasse (km)	Anzahl
0-5	3
>6	0



KNUTT (*Calidris canutus*)


Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 5.584

davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 1

davon ♂: 10 und ♀: 4

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)



Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 293

Individuen: 200

davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 212

davon in: 103 x Niederlande, 59 x Frankreich, 18 x Großbritannien, 6 x Norwegen, 4 x Deutschland, 4 x Spanien, 3 x Mauretanien, 3 x Portugal, 2 x Dänemark, 2 x Ghana, 2 x Guinea-Bissau, 2 x Marokko, 1 x Finnland, 1 x Italien, 1 x Republik Südafrika, 1 x Sowjetunion

Wiederfunde außerhalb von M-V beringter und in M-V

wiedergefundener Vögel: 36


Individuen: 29

davon aus: 27 x Polen, 6 x Norwegen, 2 x Deutschland, 1 x Italien

Reproduktion und Mortalität

Altersstruktur

Verteilung der Lebensjahre (per 1. Juli) von tot gefundenen Vögeln, die nestjung bzw. im 1. Jahr in Mecklenburg-Vorpommern beringt wurden (n = 59)





Höchstalter aus allen Wiederfunden: >13 Jahre, 4 Monate
zweitältester Vogel: >11 Jahre, 7 Monate
mittleres Totfund-Lebensjahr: 2,1

Verlustursachen

Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundenen Vögeln (n = 66)

Anteil der Totfunde "ohne bekannte Verlustursache": 19,7 %

Anthropogene Verlustursachen: 80,3 %

Verteilung der bekannten Verlustursachen:


Ursache	Anzahl
Abschuss	52
Beute menschlicher Nachstellung	1



Wanderungen und Phänologie

Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)


n = 5.645






Fangzahlen je Dekade nach Geschlecht (♂: blau, ♀: rot), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 14



Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 5.645





Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Erstfang:	15.01.
Durchzugsmedian Frühjahr:	20.02.
durchschnittlicher Jahres-Letztfang:	08.10.
Durchzugsmedian Herbst:	11.09.
größte Wiederfundentfernung:	9930 km



Fernfunde






Sumpfläufer (*Calidris falcinellus*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 138
 davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 0
 davon ♂: 0 und ♀: 0

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)





Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 5
 Individuen: 5
 davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 3
 davon in: 1 x Italien, 1 x Schweden, 1 x Ukraine

Reproduktion und Mortalität


Altersstruktur

Höchstalter aus allen Wiederfunden: >8 Monate
 zweitältester Vogel: >2 Monate
 mittleres Totfund-Lebensjahr: 1,0

Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 141



Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 141




Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Letztfang: 12.09.
 Durchzugsmedian Herbst: 06.09.
 größte Wiederfundentfernung: 1874 km



Fernfunde



Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*)


Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 2.309

davon Anzahl pulli (nichtflügelige Vögel, Nestlinge): 0

davon ♂: 27 und ♀: 54

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)





Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 46
 Individuen: 40
 davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 22
 davon in: 3 x Deutschland, 3 x Frankreich, 3 x Polen, 3 x Spanien, 2 x Griechenland, 2 x Italien, 2 x Ukraine, 1 x Marokko, 1 x Portugal, 1 x Schweden, 1 x Sowjetunion

Wiederfunde außerhalb von M-V beringter und in M-V
 wiedergefundener Vögel: 11
 Individuen: 11
 davon aus: 7 x Polen, 1 x Belgien, 1 x Litauen, 1 x Norwegen, 1 x Tschechische Republik

Reproduktion und Mortalität

Reproduktion

Höchstalter aus allen Wiederfunden: >10 Jahre
 zweitältester Vogel: >8 Jahre
 mittleres Totfund-Lebensjahr: 1,0

Verlustursachen


Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundenen Vögeln (n = 6)
 Anteil der Totfunde "ohne bekannte Verlustursache": 16,7 %
 Anteil der Totfunde, bei denen die Todesursache unbekannt ist: 16,7 %
 Anthropogene Verlustursachen: 66,7 %

Verteilung der bekannten Verlustursachen:

Ursache	Anzahl
Abschuss	4


Wanderungen und Phänologie

Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)
 n = 2.331






Fangzahlen je Dekade nach Geschlecht (♂: blau, ♀: rot), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG
n = 81



Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG
n = 2.331




Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Letztfang: 01.10.
Durchzugsmedian Herbst: 11.09.
größte Wiederfundentfernung: 5086 km



Fernfunde




MEERSTRANDLÄUFER (*Calidris maritima*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 11
 davon Anzahl pulli (nichtflügel Vögel, Nestlinge): 0
 davon ♂: 0 und ♀: 0

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)





Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 1
 Individuen: 1
 davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 1
 davon in: 1 x Schweden

Reproduktion und Mortalität


Altersstruktur

Höchstalter aus allen Wiederfunden: >4 Monate

Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 11



Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 11




Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Erstfang: 24.05.
 durchschnittlicher Jahres-Letztfang: 10.10.
 größte Wiederfundentfernung: 364 km



Fernfunde



ZWERGSTRANDLÄUFER (*Calidris minuta*)


Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 1.065

davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 0

davon ♂: 0 und ♀: 1

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)






Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 89
 Individuen: 67
 davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 17
 davon in: 8 x Frankreich, 2 x Großbritannien, 2 x Spanien, 1 x Dänemark, 1 x Deutschland, 1 x Finnland, 1 x Italien, 1 x Schweden

Wiederfunde außerhalb von M-V beringter und in M-V
 wiedergefundener Vögel: 7
 Individuen: 6
 davon aus: 4 x Polen, 3 x Finnland

Reproduktion und Mortalität

Altersstruktur

Verteilung der Lebensjahre (per 1. Juli) von tot gefundenen Vögeln, die nestjung bzw. im 1. Jahr in Mecklenburg-Vorpommern beringt wurden (n = 9)



Höchstalter aus allen Wiederfunden: >10 Jahre, 4 Monate
 zweitältester Vogel: >4 Jahre, 8 Monate
 mittleres Totfund-Lebensjahr: 1,8

Verlustursachen

Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundene Vögeln (n = 11)

Anteil der Totfunde "ohne bekannte Verlustursache": 27,3 %

Anthropogene Verlustursachen: 72,7 %

Verteilung der bekannten Verlustursachen:


Ursache	Anzahl
Abschuss	8



Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 1.127



Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG


n = 1.127



Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Letzfang: 30.09.
Durchzugsmedian Herbst: 14.09.
größte Wiederfundentfernung: 2367 km

Fernfunde






KAMPFLÄUFER (*Calidris pugnax*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 729
davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 303
davon ♂: 109 und ♀: 227

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)




Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 44
 Individuen: 43
 davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 18
 davon in: 8 x Frankreich, 3 x Italien, 1 x Dänemark, 1 x Deutschland, 1 x Finnland, 1 x Jugoslawien, 1 x Mali, 1 x Niederlande, 1 x Polen

Wiederfunde außerhalb von M-V beringter und in M-V wiedergefundener Vögel: 3
 Individuen: 3
 davon aus: 2 x Niederlande, 1 x Polen

Reproduktion und Mortalität

Anzahl beringter, nichtflügler Jungvögel je Dekade (n = 303)




Median (Dekade) = 17



Reproduktion

Anzahl beringter Jungvögel je Nest
(n = 69 Nester) 223
Mittelwert: 3,32 Jungvögel
Maximalwert: 5 Jungvögel



Altersstruktur

Höchstalter aus allen Wiederfunden: >3 Jahre
zweitältester Vogel: 8 Monate
mittleres Totfund-Lebensjahr: 1,0


Verlustursachen

Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundenen Vögeln (n = 14)

Anthropogene Verlustursachen: 78,6 %

Verteilung der bekannten Verlustursachen:

Ursache	Anzahl
Abschuss	10
Beute menschlicher Nachstellung	1
Beute von unbekanntem Tier	1
Beute von Wildtier	1
Beute von (Greif-)Vögeln	1






Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 450




Fangzahlen je Dekade nach Geschlecht (♂: blau, ♀: rot), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 365





Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 450



Fernfunde





Statistik zu Wanderungen


durchschnittlicher Jahres-Erstfang:	30.04.
Durchzugsmedian Frühjahr:	08.05.
durchschnittlicher Jahres-Letzfang:	24.09.
Durchzugsmedian Herbst:	10.09.
größte Wiederfundentfernung:	4571 km

TEMMINCKSTRANDLÄUFER (*Calidris temminckii*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 43
davon Anzahl pulli (nichtflügel Vögel, Nestlinge): 0
davon ♂: 0 und ♀: 0

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)




Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 2
Individuen: 2
davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 1
davon in: 1 x Italien

Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 47






Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG
n = 47



Fernfunde



Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Letzfang: 15.09.
größte Wiederfundentfernung: 849 km




FLUSSREGENPFEIFER (*Charadrius dubius*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 401
 davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 79
 davon ♂: 2 und ♀: 2

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)




Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 10
 Individuen: 8
 davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 7
 davon in: 4 x Deutschland, 1 x Italien, 1 x Malta, 1 x Schweiz

Wiederfunde außerhalb von M-V beringter und in M-V
 wiedergefundener Vögel: 2
 Individuen: 2
 davon aus: 1 x Dänemark, 1 x Deutschland

Reproduktion und Mortalität

Anzahl beringter, nichtflügler Jungvögel je Dekade (n = 80)




Median (Dekade) = 16



Reproduktion

Anzahl beringter Jungvögel je Nest
(n = 15 Nester) 44
Mittelwert: 3,14 Jungvögel
Maximalwert: 4 Jungvögel




Altersstruktur


Höchstalter aus allen Wiederfunden: >9 Jahre, 11 Monate
zweitältester Vogel: >8 Jahre
mittleres Totfund-Lebensjahr: 4,0

Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)
n = 321



Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG
n = 321



Fernfunde



Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Erstfang:	25.05.
durchschnittlicher Jahres-Letztfang:	09.09.
Durchzugsmedian Herbst:	07.09.
größte Wiederfundentfernung:	1993 km




SANDREGENPFEIFER (*Charadrius hiaticula*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 7.693
davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 2.557
davon ♂: 610 und ♀: 657

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)




Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 514
 Individuen: 417
 davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 167
 davon in: 60 x Frankreich, 42 x Großbritannien, 22 x Deutschland, 7 x Schweden, 7 x Spanien, 6 x Niederlande, 5 x Irland, 4 x Polen, 4 x Sowjetunion, 2 x Belgien, 2 x Kanalinseln, 2 x Portugal, 1 x Dänemark

Wiederfunde außerhalb von M-V beringter und in M-V
 wiedergefundener Vögel: 21
 Individuen: 18
 davon aus: 9 x Deutschland, 4 x Polen, 2 x Finnland, 2 x Spanien, 1 x Belgien, 1 x Dänemark, 1 x Frankreich, 1 x Niederlande

Reproduktion und Mortalität

Anzahl beringter, nichtflügler Jungvögel je Dekade (n = 2.575)




Median (Dekade) = 18




Reproduktion

Anzahl beringter Jungvögel je Nest
 (n = 379 Nester) 1.181
 Mittelwert: 3,13 Jungvögel
 Maximalwert: 4 Jungvögel



Altersstruktur

Verteilung der Lebensjahre (per 1. Juli) von tot gefundenen Vögeln, die nestjung bzw. im 1. Jahr in Mecklenburg-Vorpommern beringt wurden (n = 40)



Höchstalter aus allen Wiederfunden: 18 Jahre, 2 Monate

zweitältester Vogel: 8 Jahre, 11 Monate

mittleres Totfund-Lebensjahr: 2,5

Verlustursachen


Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundenen Vögeln (n = 75)

Anteil der Totfunde "ohne bekannte Verlustursache": 50,7 %

Anthropogene Verlustursachen: 44,0 %

Verteilung der bekannten Verlustursachen:


Ursache	Anzahl
Abschuss	30
Beute menschlicher Nachstellung	2
Straßenverkehr	1
Beute von Haustier	1
Beute von Wildtier	1
Beute von (Greif-)Vögeln	1
ertrunken	1



Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 4.710







Fangzahlen je Dekade nach Geschlecht (♂: blau, ♀: rot), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG
 n = 807



Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG
 n = 4.710



Fernfunde






Brutorttreue/-wechsel: n = 60 Vögel

Tabelle / Diagramm (Abstände Brutort zum früheren Brutort):


Klasse (km)	Anzahl
0-5	54
6-10	2
11-200	2
201-400	2
>400	0



Geburtsorttreue (Dismigration): n = 64 Vögel

Tabelle / Diagramm (Abstände Brutort zum Geburtsort):

Klasse (km)	Anzahl
0-5	41
6-10	0
11-25	8
26-50	5
51-100	4
101-200	5
201-400	1
>400	0






ZWERGSCHNEPFLE (*Lymnocyptes minimus*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 309
davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 0
davon ♂: 0 und ♀: 0

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)



Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 18
Individuen: 16
davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 10
davon in: 6 x Frankreich, 3 x Spanien, 1 x Italien

Reproduktion und Mortalität

Altersstruktur

Verteilung der Lebensjahre (per 1. Juli) von tot gefundenen Vögeln, die nestjung bzw. im 1. Jahr in Mecklenburg-Vorpommern beringt wurden (n = 6)

Lebensjahr	Anzahl
1	2
2	4

Höchstalter aus allen Wiederfunden: 1 Jahr, 5 Monate
zweitältester Vogel: 1 Jahr, 4 Monate
mittleres Totfund-Lebensjahr: 1,7

Verlustursachen


Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundenen Vögeln (n = 10)

Anteil der Totfunde "ohne bekannte Verlustursache": 10,0 %

Anthropogene Verlustursachen: 90,0 %

Verteilung der bekannten Verlustursachen:


Ursache	Anzahl
Abschuss	8
Beute menschlicher Nachstellung	1



Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 317




Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 317





Fernfunde



Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Erstfang:	09.04.
durchschnittlicher Jahres-Letzfang:	23.10.
Durchzugsmedian Herbst:	11.10.
größte Wiederfundentfernung:	2053 km



DUNKLER WASSERLÄUFER (*Tringa erythropus*)


Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 236

davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 0

davon ♂: 2 und ♀: 0

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)



Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 5
 Individuen: 4
 davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 4
 davon in: 3 x Frankreich, 1 x Spanien

Reproduktion und Mortalität

Altersstruktur

Höchstalter aus allen Wiederfunden: 3 Monate


zweitältester Vogel: 0 Monate

mittleres Totfund-Lebensjahr: 1,0

Wanderungen und Phänologie

Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)


n = 237





Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG


n = 237



Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Erstfang: 26.04.
durchschnittlicher Jahres-Letzfang: 05.10.
Durchzugsmedian Herbst: 30.09.
größte Wiederfundentfernung: 1817 km

Fernfunde





Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)


Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 375

davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 0

davon ♂: 0 und ♀: 0

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)



Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 32

Individuen: 27

davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 5

davon in: 3 x Frankreich, 1 x Gabun, 1 x Italien

Wiederfunde außerhalb von M-V beringter und in M-V

wiedergefundener Vögel: 1

Individuen: 1

davon aus: 1 x Niederlande

Reproduktion und Mortalität

Altersstruktur

Höchstalter aus allen Wiederfunden: 2 Jahre, 1 Monat

zweitältester Vogel: >7 Monate

mittleres Totfund-Lebensjahr: 1,7

Verlustursachen

Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundene Vögeln (n = 5)

Anteil der Totfunde "ohne bekannte Verlustursache": 40,0 %

Anthropogene Verlustursachen: 60,0 %

Verteilung der bekannten Verlustursachen:


Ursache	Anzahl
Abschuss	3



Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 430




Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 430



Fernfunde



Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Erstfang:	07.05.
durchschnittlicher Jahres-Letzfang:	07.09.
größte Wiederfundentfernung:	5969 km




GRÜNSCHENKEL (*Tringa nebularia*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 245
 davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 1
 davon ♂: 0 und ♀: 0

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)



Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 11
 Individuen: 10
 davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 7
 davon in: 3 x Frankreich, 1 x Italien, 1 x Mali, 1 x Sowjetunion, 1 x Spanien

Reproduktion und Mortalität

Altersstruktur

Verteilung der Lebensjahre (per 1. Juli) von tot gefundenen Vögeln, die nestjung bzw. im 1. Jahr in Mecklenburg-Vorpommern beringt wurden (n = 4)

Lebensjahr	Anzahl
1	3
2	1

Höchstalter aus allen Wiederfunden: 1 Jahr, 2 Monate
 zweitältester Vogel: 3 Monate
 mittleres Totfund-Lebensjahr: 1,3

Verlustursachen

Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundenen Vögeln (n = 7)

Anteil der Totfunde "ohne bekannte Verlustursache": 28,6 %

Anthropogene Verlustursachen: 71,4 %

Verteilung der bekannten Verlustursachen:


Ursache	Anzahl
Abschuss	4
Beute menschlicher Nachstellung	1



Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 245




Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 245



Fernfunde



Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Letzfang:	29.09.
Durchzugsmedian Herbst:	17.09.
größte Wiederfundentfernung:	4551 km



WALDWASSERLÄUFER (*Tringa ochropus*)


Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 109

davon Anzahl pulli (nichtflügel Vögel, Nestlinge): 29


davon ♂: 0 und ♀: 2

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)



Reproduktion und Mortalität

Anzahl beringter, nichtflügender Jungvögel je Dekade (n = 29)




Median (Dekade) = 15



Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 88




Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 88





Fernfunde



Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Erstfang:	23.05.
Durchzugsmedian Frühjahr:	22.05.
durchschnittlicher Jahres-Letzfang:	19.09.
größte Wiederfundentfernung:	1225 km



TEICHWASSERLÄUFER (*Tringa stagnatilis*)

Beringung- und Wiederfundstatistik


Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 2
davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 0
davon ♂: 0 und ♀: 0

ROTSCHENKEL (*Tringa totanus*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 10.295
davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 1.093
davon ♂: 6 und ♀: 10

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)




Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 492
 Individuen: 446
 davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 284
 davon in: 206 x Frankreich, 11 x Spanien, 9 x Deutschland, 9 x Schweden, 7 x Dänemark, 7 x Niederlande, 5 x Großbritannien, 5 x Italien, 4 x Portugal, 3 x Finnland, 2 x Marokko, 1 x Belgien, 1 x Jugoslawien, 1 x Sowjetunion

Wiederfunde außerhalb von M-V beringter und in M-V wiedergefundener Vögel: 51
 Individuen: 46
 davon aus: 20 x Polen, 9 x Schweden, 4 x Deutschland, 4 x Finnland, 4 x Frankreich, 3 x Portugal, 2 x Dänemark, 2 x Estland, 1 x Lettland, 1 x Litauen, 1 x Niederlande



Reproduktion und Mortalität


Anzahl beringter, nichtflügger Jungvögel je Dekade (n = 1.100)



Median (Dekade) = 16


Reproduktion

Anzahl beringter Jungvögel je Nest
(n = 248 Nester) 761
Mittelwert: 3,1 Jungvögel
Maximalwert: 4 Jungvögel



Altersstruktur

Verteilung der Lebensjahre (per 1. Juli) von tot gefundenen Vögeln, die nestjung bzw. im 1. Jahr in Mecklenburg-Vorpommern beringt wurden (n = 224)



Höchstalter aus allen Wiederfunden: >13 Jahre
zweitältester Vogel: >11 Jahre, 10 Monate
mittleres Totfund-Lebensjahr: 1,6



Verlustursachen

Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundenen Vögeln (n = 251)


Anteil der Totfunde "ohne bekannte Verlustursache": 0,8 %

Anteil der Totfunde, bei denen die Todesursache unbekannt ist: 18,7 %

Anthropogene Verlustursachen: 79,7 %

Verteilung der bekannten Verlustursachen:

Ursache	Anzahl
Abschuss	195
Beute menschlicher Nachstellung	4
verölt	1
Beute von unbekanntem Tier	1
Beute von (Greif-)Vögeln	1






Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 9.190



Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG


n = 9.190




Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Erstfang:	19.04.
Durchzugsmedian Frühjahr:	03.05.
durchschnittlicher Jahres-Letzfang:	05.10.
Durchzugsmedian Herbst:	08.09.
größte Wiederfundentfernung:	5434 km

Fernfunde






Brutorttreue/-wechsel: n = 12 Vögel

Tabelle / Diagramm (Abstände Brutort zum früheren Brutort):

Klasse (km)	Anzahl
0-5	9
6-200	0
201-400	1
>400	2






TEREKWASSERLÄUFER (*Xenus cinereus*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 1
davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 0
davon ♂: 0 und ♀: 0

Wiederfunde außerhalb von M-V beringter und in M-V
wiedergefundener Vögel: 1
Individuen:

Fernfunde



Statistik zu Wanderungen

größte Wiederfundentfernung: 1383 km



FLUSSUFERLÄUFER (*Actitis hypoleucos*)


Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 3.505

davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 1

davon ♂: 0 und ♀: 2

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)



Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 139

Individuen: 115

davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 29

davon in: 10 x Frankreich, 10 x Spanien, 3 x Deutschland, 2 x Niederlande, 2 x Schweden, 1 x Belgien, 1 x Polen

Wiederfunde außerhalb von M-V beringter und in M-V

wiedergefundener Vögel: 6

Individuen: 6

davon aus: 1 x Dänemark, 1 x Deutschland, 1 x Finnland, 1 x Polen, 1 x Schweden, 1 x Spanien

Reproduktion und Mortalität

Altersstruktur

Höchstalter aus allen Wiederfunden: >7 Jahre, 1 Monat

zweitältester Vogel: >5 Jahre

mittleres Totfund-Lebensjahr: 1,3

Verlustursachen

Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundene Vögeln (n = 13)

Anteil der Totfunde "ohne bekannte Verlustursache": 53,8 %

Anthropogene Verlustursachen: 46,2 %

Verteilung der bekannten Verlustursachen:


Ursache	Anzahl
Abschuss	6



Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 3.591



Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 3.591




Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Erstfang:	07.05.
durchschnittlicher Jahres-Letzfang:	12.09.
Durchzugsmedian Herbst:	06.09.
größte Wiederfundentfernung:	2269 km



Fernfunde




STEINWÄLZER (*Arenaria interpres*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 870
 davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 0
 davon ♂: 6 und ♀: 2

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)






Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 167
 Individuen: 69
 davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 125
 davon in: 96 x Niederlande, 7 x Spanien, 6 x Frankreich, 5 x Belgien, 2 x Finnland, 2 x Schweden, 1 x Dänemark, 1 x Deutschland, 1 x Gabun, 1 x Guinea-Bissau, 1 x Polen, 1 x Senegal

Wiederfunde außerhalb von M-V beringter und in M-V
 wiedergefundener Vögel: 10
 Individuen: 10
 davon aus: 3 x Finnland, 3 x Polen, 3 x Schweden, 1 x Russland

Reproduktion und Mortalität

Altersstruktur

Verteilung der Lebensjahre (per 1. Juli) von tot gefundenen Vögeln, die nestjung bzw. im 1. Jahr in Mecklenburg-Vorpommern beringt wurden (n = 8)



Höchstalter aus allen Wiederfunden: >12 Jahre, 7 Monate
 zweitältester Vogel: >7 Jahre, 3 Monate
 mittleres Totfund-Lebensjahr: 1,9

Verlustursachen

Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundene Vögeln (n = 11)


Anteil der Totfunde "ohne bekannte Verlustursache": 63,6 %

Anthropogene Verlustursachen: 27,3 %

Verteilung der bekannten Verlustursachen:

Ursache	Anzahl
Abschuss	3
Kälte, Schnee, Eis	1

Fernfunde





Statistik zu Wanderungen


durchschnittlicher Jahres-Erstfang:	14.04.
Durchzugsmedian Frühjahr:	10.04.
durchschnittlicher Jahres-Letzfang:	27.09.
Durchzugsmedian Herbst:	12.09.
größte Wiederfundentfernung:	5914 km

PFUHLSCHNEPFE (*Limosa lapponica*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 1.991
 davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 0
 davon ♂: 86 und ♀: 71

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)



Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 67
 Individuen: 59
 davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 33
 davon in: 15 x Frankreich, 8 x Niederlande, 5 x Deutschland, 2 x Sowjetunion, 1 x Elfenbeinküste, 1 x Polen, 1 x Spanien


Wiederfunde außerhalb von M-V beringter und in M-V
 wiedergefundener Vögel: 2
 Individuen: 2
 davon aus: 1 x Niederlande, 1 x Polen



Reproduktion und Mortalität

Altersstruktur

Verteilung der Lebensjahre (per 1. Juli) von tot gefundenen Vögeln, die nestjung bzw. im 1. Jahr in Mecklenburg-Vorpommern beringt wurden (n = 26)



Höchstalter aus allen Wiederfunden: >17 Jahre, 7 Monate

zweitältester Vogel: >16 Jahre, 5 Monate

mittleres Totfund-Lebensjahr: 2,7

Verlustursachen


Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundenen Vögeln (n = 29)

Anteil der Totfunde "ohne bekannte Verlustursache": 34,5 %

Anthropogene Verlustursachen: 58,6 %

Verteilung der bekannten Verlustursachen:

Ursache	Anzahl
Abschuss	15
Straßenverkehr	1
Gebäudekollision	1
Beute von (Greif-)Vögeln	2






Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 1.995




Fangzahlen je Dekade nach Geschlecht (♂: blau, ♀: rot), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 157






Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 1.995



Fernfunde





Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Erstfang:	01.05.
durchschnittlicher Jahres-Letzfang:	15.10.
Durchzugsmedian Herbst:	22.09.
größte Wiederfundentfernung:	5639 km




UFERSCHNEPFE (*Limosa limosa*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 448
 davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 435
 davon ♂: 1 und ♀: 1


jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)



Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 12
 Individuen: 11
 davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 9
 davon in: 3 x Frankreich, 2 x Spanien, 1 x Italien, 1 x Marokko, 1 x Niederlande, 1 x Senegal

Reproduktion und Mortalität

Anzahl beringter, nichtflügler Jungvögel je Dekade (n = 441)




Median (Dekade) = 15




Reproduktion

Anzahl beringter Jungvögel je Nest
(n = 121 Nester) 352
Mittelwert: 2,96 Jungvögel
Maximalwert: 6 Jungvögel



Altersstruktur

Verteilung der Lebensjahre (per 1. Juli) von tot gefundenen Vögeln, die nestjung bzw. im 1. Jahr in Mecklenburg-Vorpommern beringt wurden (n = 9)



Höchstalter aus allen Wiederfunden: 16 Jahre, 10 Monate
zweitältester Vogel: 6 Jahre, 3 Monate
mittleres Totfund-Lebensjahr: 4,4

Verlustursachen

Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundenen Vögeln (n = 9)

Anteil der Totfunde "ohne bekannte Verlustursache": 33,3 %

Anthropogene Verlustursachen: 66,7 %

Verteilung der bekannten Verlustursachen:


Ursache	Anzahl
Abschuss	6



Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 10



Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 10



Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Erstfang: 15.05.
 Durchzugsmedian Frühjahr: 22.05.
 durchschnittlicher Jahres-Letzfang: 22.09.
 größte Wiederfundentfernung: 4388 km


Brutorttreue/-wechsel: n = 1 Vogel

Tabelle / Diagramm (Abstände Brutort zum früheren Brutort):

Klasse (km)	Anzahl
0-5	1
6-100	0
101-200	0
201-400	0
>400	0



Fernfunde




GROBER BRACHVOGEL (*Numenius arquata*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 171
davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 17
davon ♂: 2 und ♀: 5

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)






Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 15
Individuen: 14
davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 13
davon in: 4 x Frankreich, 3 x Dänemark, 3 x Niederlande, 2 x Deutschland, 1 x Großbritannien

Reproduktion und Mortalität


Anzahl beringter, nichtflügger Jungvögel je Dekade (n = 18)



Median (Dekade) = 16


Reproduktion

Anzahl beringter Jungvögel je Nest
(n = 7 Nester) 16
Mittelwert: 2,72 Jungvögel
Maximalwert: 4 Jungvögel



Altersstruktur

Verteilung der Lebensjahre (per 1. Juli) von tot gefundenen Vögeln, die nestjung bzw. im 1. Jahr in Mecklenburg-Vorpommern beringt wurden (n = 9)





Höchstalter aus allen Wiederfunden: 3 Jahre, 11 Monate
zweitältester Vogel: 3 Jahre, 8 Monate
mittleres Totfund-Lebensjahr: 1,9

Verlustursachen


Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundenen Vögeln (n = 13)

Anteil der Totfunde "ohne bekannte Verlustursache": 38,5 %

Anthropogene Verlustursachen: 53,8 %

Verteilung der bekannten Verlustursachen:

Ursache	Anzahl
Abschuss	7
Kälte, Schnee, Eis	1






Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 154




Fangzahlen je Dekade nach Geschlecht (♂: blau, ♀: rot), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 7



Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 154




Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Letztfang:	05.10.
Durchzugsmedian Herbst:	20.09.
größte Wiederfundentfernung:	1181 km



Fernfunde





Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*)


Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 223

davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 0

davon ♂: 1 und ♀: 7

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)



Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 11

Individuen: 11

davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 9

davon in: 7 x Frankreich, 1 x Dänemark, 1 x Italien

Reproduktion und Mortalität

Altersstruktur

Höchstalter aus allen Wiederfunden: 2 Monate

Verlustursachen

Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundenen Vögeln (n = 7)

Anthropogene Verlustursachen: 100 %

Verteilung der bekannten Verlustursachen:


Ursache	Anzahl
Abschuss	7



Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 225




Fangzahlen je Dekade nach Geschlecht (♂: blau, ♀: rot), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 8




Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 225



Fernfunde



Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Erstfang:	27.04.
durchschnittlicher Jahres-Letzfang:	14.09.
größte Wiederfundentfernung:	1266 km




GOLDREGENPFEIFER (*Pluvialis apricaria*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 22
davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 0
davon ♂: 0 und ♀: 0

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)



Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 1
Individuen: 1
davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 1 x Frankreich

Wiederfunde außerhalb von M-V beringter und in M-V
wiedergefundener Vögel: 1
Individuen: 1
davon aus: 1 x Niederlande


Reproduktion und Mortalität

Altersstruktur

Höchstalter aus allen Wiederfunden: 2 Jahre, 7 Monate
zweitältester Vogel: >6 Monate
mittleres Totfund-Lebensjahr: 3,0

Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)
n = 22






Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 22



Fernfunde



Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Letzfang:
größte Wiederfundentfernung:

03.10.
1397 km



KIEBITZREGENPFEIFER (*Pluvialis squatarola*)


Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 1.816

davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 0

davon ♂: 20 und ♀: 20

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)



Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 38

Individuen: 37


davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 37

davon in: 20 x Frankreich, 4 x Deutschland, 4 x Spanien, 3 x Großbritannien, 3 x Niederlande, 1 x Ägypten, 1 x Portugal

Reproduktion und Mortalität

Altersstruktur

Verteilung der Lebensjahre (per 1. Juli) von tot gefundenen Vögeln, die nestjung bzw. im 1. Jahr in Mecklenburg-Vorpommern beringt wurden (n = 24)





Höchstalter aus allen Wiederfunden: 14 Jahre, 5 Monate
zweitältester Vogel: 8 Jahre, 4 Monate
mittleres Totfund-Lebensjahr: 3,3

Verlustursachen


Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundenen Vögeln (n = 30)

Anteil der Totfunde "ohne bekannte Verlustursache": 36,7 %

Anthropogene Verlustursachen: 60,0 %

Verteilung der bekannten Verlustursachen:

Ursache	Anzahl
Abschuss	17
Beute menschlicher Nachstellung	1
Beute von Haustier	1






Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 1.827




Fangzahlen je Dekade nach Geschlecht (♂: blau, ♀: rot), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 40



Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 1.827




Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Erstfang:	10.05.
durchschnittlicher Jahres-Letzfang:	24.10.
Durchzugsmedian Herbst:	04.10.
größte Wiederfundentfernung:	3640 km



Fernfunde




KIEBITZ (*Vanellus vanellus*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 1.906
davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 1.768
davon ♂: 9 und ♀: 14

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)






Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 41
 Individuen: 37
 davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 20
 davon in: 13 x Frankreich, 2 x Deutschland, 2 x Niederlande, 2 x Spanien, 1 x Italien

Wiederfunde außerhalb von M-V beringter und in M-V
 wiedergefundener Vögel: 1
 Individuen: 1
 davon aus: 1 x Großbritannien

Reproduktion und Mortalität


Anzahl beringter, nichtflügger Jungvögel je Dekade (n = 1.779)



Median (Dekade) = 16

Reproduktion


Anzahl beringter Jungvögel je Nest
 (n = 435 Nester) 1.223
 Mittelwert: 2,85 Jungvögel
 Maximalwert: 7 Jungvögel





Altersstruktur

Verteilung der Lebensjahre (per 1. Juli) von tot gefundenen Vögeln, die nestjung bzw. im 1. Jahr in Mecklenburg-Vorpommern beringt wurden (n = 21)



Höchstalter aus allen Wiederfunden: >7 Jahre, 1 Monat
zweitältester Vogel: 5 Jahre, 10 Monate
mittleres Totfund-Lebensjahr: 2,3

Verlustursachen


Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundenen Vögeln (n = 26)

Anteil der Totfunde "ohne bekannte Verlustursache": 46,2 %

Anthropogene Verlustursachen: 53,8 %

Verteilung der bekannten Verlustursachen:

Ursache	Anzahl
Abschuss	13
Beute menschlicher Nachstellung	1






Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 142




Fangzahlen je Dekade nach Geschlecht (♂: blau, ♀: rot), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 15




Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 142



Fernfunde



Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Erstfang:	05.05.
Durchzugsmedian Frühjahr:	17.05.
durchschnittlicher Jahres-Letzfang:	06.10.
Durchzugsmedian Herbst:	28.09.
größte Wiederfundentfernung:	2110 km




BEKASSINE (*Gallinago gallinago*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 2.837
 davon Anzahl pulli (nichtflügel Vögel, Nestlinge): 30
 davon ♂: 1 und ♀: 1

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)




Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 209
 Individuen: 194
 davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 110
 davon in: 72 x Frankreich, 12 x Großbritannien, 5 x Dänemark, 5 x Niederlande, 4 x Belgien, 4 x Italien, 3 x Portugal, 2 x Sowjetunion, 1 x Irland, 1 x Spanien, 1 x Ukraine

Wiederfunde außerhalb von M-V beringter und in M-V wiedergefundener Vögel: 4
 Individuen: 4
 davon aus: 3 x Deutschland, 1 x Polen

Reproduktion und Mortalität

Anzahl beringter, nichtflügel Jungvögel je Dekade (n = 30)




Median (Dekade) = 16




Reproduktion

Anzahl beringter Jungvögel je Nest
(n = 8 Nester) 29
Mittelwert: 3,63 Jungvögel
Maximalwert: 4 Jungvögel



Altersstruktur

Verteilung der Lebensjahre (per 1. Juli) von tot gefundenen Vögeln, die nestjung bzw. im 1. Jahr in Mecklenburg-Vorpommern beringt wurden (n = 69)



Höchstalter aus allen Wiederfunden: 10 Jahre, 3 Monate

zweitältester Vogel: 10 Jahre, 3 Monate

mittleres Totfund-Lebensjahr: 2,0

Verlustursachen

Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundenen Vögeln (n = 117)

Anteil der Totfunde "ohne bekannte Verlustursache": 0,8 %

Anteil der Totfunde, bei denen die Todesursache unbekannt ist: 16,2 %


Anthropogene Verlustursachen: 82,0 %

Verteilung der bekannten Verlustursachen:

Ursache	Anzahl
Abschuss	93
Beute menschlicher Nachstellung	1
Straßenverkehr	1
Freileitung	1
Beute von unbekanntem Tier	1



Fernfunde





Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Erstfang:	20.04.
durchschnittlicher Jahres-Letzfang:	19.10.
Durchzugsmedian Herbst:	23.09.
größte Wiederfundentfernung:	2429 km

DOPPELSCHNEPFE (*Gallinago media*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 2
davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 0
davon ♂: 0 und ♀: 0

GROBER SCHLAMMLÄUFER (*Limnodromus scolopaceus*)

Beringung- und Wiederfundstatistik


Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 1
davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 0
davon ♂: 0 und ♀: 0

WALDSCHNEPFE (*Scolopax rusticola*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 135
davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 4
davon ♂: 0 und ♀: 1

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)





Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 15
 Individuen: 15
 davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 11
 davon in: 5 x Frankreich, 4 x Großbritannien, 1 x Russland, 1 x Spanien

Wiederfunde außerhalb von M-V beringter und in M-V
 wiedergefundener Vögel: 1
 Individuen: 1
 davon aus: 1 x Frankreich

Reproduktion und Mortalität

Anzahl beringter, nichtflügger Jungvögel je Dekade (n = 4)
 Median (Dekade) = 15

Altersstruktur

Verteilung der Lebensjahre (per 1. Juli) von tot gefundenen Vögeln, die nestjung bzw. im 1. Jahr in Mecklenburg-Vorpommern beringt wurden (n = 4)

Lebensjahr	Anzahl
1	1
2	2
3	1

Höchstalter aus allen Wiederfunden: 2 Jahre, 3 Monate
 zweitältester Vogel: 1 Jahr, 4 Monate
 mittleres Totfund-Lebensjahr: 2,0

Verlustursachen

Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundene Vögeln (n = 12)

Anteil der Totfunde "ohne bekannte Verlustursache": 25,0 %

Anthropogene Verlustursachen: 75,0 %


Verteilung der bekannten Verlustursachen:

Ursache	Anzahl
Abschuss	9

Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 132






Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG
 n = 132



Fernfunde



Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Erstfang:	20.03.
Durchzugsmedian Frühjahr:	26.03.
durchschnittlicher Jahres-Letzfang:	27.10.
Durchzugsmedian Herbst:	03.11.
größte Wiederfundentfernung:	1760 km



AUSTERNFISCHER (*Haematopus ostralegus*)


Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 1.302

davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 668

davon ♂: 39 und ♀: 40

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)




Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 358
 Individuen: 263
 davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 52
 davon in: 15 x Frankreich, 14 x Deutschland, 12 x Niederlande, 3 x Dänemark, 3 x Schweden, 2 x Belgien, 1 x Großbritannien, 1 x Sowjetunion

Wiederfunde außerhalb von M-V beringter und in M-V
 wiedergefundener Vögel: 2
 Individuen: 2
 davon aus: 1 x Deutschland, 1 x Finnland

Reproduktion und Mortalität

Anzahl beringter, nichtflügler Jungvögel je Dekade (n = 700)




Median (Dekade) = 17




Reproduktion

Anzahl beringter Jungvögel je Nest
 (n = 134 Nester) 305
 Mittelwert: 2,3 Jungvögel
 Maximalwert: 4 Jungvögel



Altersstruktur

Verteilung der Lebensjahre (per 1. Juli) von tot gefundenen Vögeln, die nestjung bzw. im 1. Jahr in Mecklenburg-Vorpommern beringt wurden (n = 52)



Höchstalter aus allen Wiederfunden: >21 Jahre

zweitältester Vogel: >19 Jahre

mittleres Totfund-Lebensjahr: 4,4

Verlustursachen


Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundenen Vögeln (n = 84)

Anteil der Totfunde "ohne bekannte Verlustursache": 72,6 %

Anthropogene Verlustursachen: 20,2 %

Verteilung der bekannten Verlustursachen:


Ursache	Anzahl
Abschuss	14
Straßenverkehr	1
verölt	1
Beute von Haustier	1
Beute von Wildtier	1
Beute von (Greif-)Vögeln	2
Kälte, Schnee, Eis	2
durch Vogelring verunglückt	1



Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 504




Fangzahlen je Dekade nach Geschlecht (♂: blau, ♀: rot), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 20





Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG
 n = 504




Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Erstfang: 03.05.
 Durchzugsmedian Frühjahr: 22.05.
 durchschnittlicher Jahres-Letztfang: 06.10.
 Durchzugsmedian Herbst: 24.09.
 größte Wiederfundentfernung: 2124 km



Brutorttreue/-wechsel: n = 90 Vögel

Tabelle / Diagramm (Abstände Brutort zum früheren Brutort):

Klasse (km)	Anzahl
0-5	85
6-10	0
>11	5



Fernfunde






Geburtsorttreue (Dismigration): n = 21 Vögel

Tabelle / Diagramm (Abstände Brutort zum Geburtsort):

Klasse (km)	Anzahl
0-5	16
6-10	0
11-25	4
26-200	0
201-400	0
>400	1



THORSHÜHNCHEN (*Phalaropus fulicarius*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 1
davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 0
davon ♂: 0 und ♀: 0




ODINSHÜHNCHEN (*Phalaropus lobatus*)

Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 11
davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 0
davon ♂: 1 und ♀: 1

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)




Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 1
Individuen: 1

Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 12



Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 12





SÄBELSCHNÄBLER (*Recurvirostra avosetta*)


Beringung- und Wiederfundstatistik

Anzahl Beringungen in Mecklenburg-Vorpommern: 2.428

davon Anzahl pulli (nichtflügge Vögel, Nestlinge): 2.378

davon ♂: 2 und ♀: 2

jährliche Beringungszahlen (seit der vollständigen digitalen Erfassung 1977)




Wiederfunde von in M-V beringten Vögeln (1964 - 2012): 57
 Individuen: 57
 davon außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern: 18
 davon in: 9 x Frankreich, 5 x Spanien, 1 x Niederlande, 1 x Polen, 1 x Portugal, 1 x Senegal

Wiederfunde außerhalb von M-V beringter und in M-V
 wiedergefundener Vögel: 2
 Individuen: 2
 davon aus: 2 x Deutschland

Reproduktion und Mortalität

Anzahl beringter, nichtflügler Jungvögel je Dekade (n = 2.406)




Median (Dekade) = 17




Reproduktion

Anzahl beringter Jungvögel je Nest
(n = 520 Nester) 1.319
Mittelwert: 2,55 Jungvögel
Maximalwert: 5 Jungvögel



Altersstruktur

Verteilung der Lebensjahre (per 1. Juli) von tot gefundenen Vögeln, die nestjung bzw. im 1. Jahr in Mecklenburg-Vorpommern beringt wurden (n = 29)




Höchstalter aus allen Wiederfunden: 14 Jahre, 11 Monate
zweitältester Vogel: 11 Jahre, 1 Monat
mittleres Totfund-Lebensjahr: 2,1

Verlustursachen

Verteilung der Todesursachen von in Mecklenburg-Vorpommern beringten oder wiedergefundenen Vögeln (n = 31)
Anteil der Totfunde "ohne bekannte Verlustursache": 83,9 %
Anthropogene Verlustursachen: 12,9 %

Verteilung der bekannten Verlustursachen:


Ursache	Anzahl
Abschuss	4
Beute von (Greif-)Vögeln	1



Wanderungen und Phänologie


Fangzahlen je Dekade (ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG)

n = 15




Fangzahlen je Dekade nach Alter (diesjährig: grün), ohne Brutstatus, ohne NFL und NJG

n = 15



Fernfunde



Statistik zu Wanderungen

durchschnittlicher Jahres-Erstfang:	25.05.
Durchzugsmedian Frühjahr:	22.05.
größte Wiederfundentfernung:	4906 km